

Segni di presenza



Segni di passaggio

Impronte

Le impronte misurano circa
cm 11,5 x 8
(speroni inclusi) nei maschi adulti

La forma e le dimensioni le rendono
spesso riconoscibili



Trottoi

L'abitudinarietà che contraddistingue
la specie nei tragitti di spostamento,
produce i cosiddetti "trottoi", che
sono segni evidenti del passaggio
degli animali, dovuti a intenso
calpestio



Segni di passaggio

Impronte



Insogli

Di norma, vengono realizzati in pozze con acqua ferma e fangosa

I “bagni di fango” hanno due funzioni: coadiuvare la termoregolazione e facilitare la liberazione dai parassiti cutanei




Grattato



Grufolate (*rooting*)

Provocate dall'attività alimentare del suide quando ricerca cibi ipogei

Si presentano come vere e proprie arature del terreno, di profondità fino a 40 cm ed estensione anche di alcune decine di metri quadri



Anche i soggetti appartenenti alle classi giovanili grufolano

Escrementi

Presentano forma rotondeggiante od allungata ed hanno un diametro di 3 - 5 cm

Non essendo il cinghiale un ruminante, nelle feci si riconoscono frammenti non completamente digeriti di origine vegetale



Escrementi



Classi di età




Piccoli

Classe 0

Striati

(0-4 mesi)




- Mantello striato
- Sessi indistinguibili
- Coda corta, sopra il tallone

Classe 1

Rossi

(5-12 mesi)



- Mantello rossiccio
- Sessi indistinguibili
- Coda corta, sopra il tallone

Sub-adulti ed adulti

Classe 2

Neri

(sub-adulti ed adulti dai 12 mesi in poi)



***Sub-adulto
di 1 anno***



***Femmina
adulta***


- Manto (invernale) nero
- La coda supera il tallone (abbondantemente negli esemplari di età avanzata)
- Differenze tra i sessi apprezzabili




***Maschio
adulto***

La dentatura

Vista palatale di mandibola e mascella dello stesso cranio:




La dentatura




Formula dentaria definitiva del cinghiale

	Incisivi	Canini	Premolari	Molari	Totale x 2
Superiore	3	1	4	3	44
Inferiore	3	1	4	3	


La dentatura




La dentatura




La dentatura




La dentatura



La dentatura



La dentatura



La dentatura

Per valutare l'età fino a **3 anni**, risulta sufficiente controllare l'eruzione dei **molari** (che compaiono solo come denti definitivi) e la sostituzione del p4 (dente da latte tri-lobato) in P4 (dente definitivo bi-lobato)


Oltre i 3 anni di età ci si può basare sullo stato di usura dei molari che inizia dalla 1^a parte di **M1** proseguendo poi in **M2** e **M3** (si evidenzia la scura dentina)

La dentatura

INCISIVI

Gli incisivi da latte sono sottili e lisci.
Vengono indicati con numeri arabi (1,2)


Gli incisivi definitivi sono meno sottili e scanalati.
Vengono indicati con numeri romani (I,II,III)




12 mesi di età
Nella mandibola è comparsa una sola coppia di incisivi definitivi (III), permangono due coppie di incisivi da latte (1,2)



15 mesi di età
Compare un'altra coppia di incisivi definitivi (I)




18 mesi di età
Permane una sola coppia di incisivi da latte (2)




22-24 mesi di età
Si osservano solo incisivi definitivi (I,II,III)



14-17 mesi di età
Non è comparso il 3° molare



Oltre 2 anni
È comparso il 3° molare



3-4 anni
Il terzo molare appare consumato

Fig. 14.1. Determinazione dell'età dei cinghiali in base all'esame della dentatura della mandibola.

La dentatura



Foto 10.4: *Zanna*

foto di Alessandro Martini

Le zanne crescono non solo in lunghezza ma anche in larghezza

La dentatura




Foto 10.5: *Zanna di maschio anziano*

foto di Alessandro Martini


Nei maschi anziani (7 – 8 anni) il diametro del canino alla base è uguale al diametro del canino dove inizia la superficie di sfregamento

A - Misure Biometriche del cinghiale



Misure bionetriche del cinghiale: **Lt** lunghezza testa; **tc** lunghezza testa-coda; **c** lunghezza coda; **g** garrese; **mt** metatarso; **o** orecchio (fonte: Nobile. 1989)

A - Misure Biometriche del cinghiale



L'accrescimento corporeo del cinghiale si ferma intorno ai 2 – 3 anni
Alcune misure, come la lunghezza della testa, l'altezza del garrese ed il peso continuano invece a progredire.